

CITRAFLEET/PICOPREP TÁJÉKOZTATÓ

Mivel Ön kolonoszkópia előtt áll, vizsgálata előtt diétát kell tartania és béltisztító készítményt kell alkalmaznia a belek kitisztítása érdekében. A jó béltisztítás a pontos diagnózis alapvető feltétele. Kezelőorvosa a CITRAFLEET/PICOPREP nevű készítményt ajánlotta Önnek, amelyet a Budai Egészségközpont vizsgálati rendje szerint a következőképpen kell alkalmaznia.



Miután megitta a CITRAFLEET/PICOPREP-et, tartózkodjon mosdó közelében, mivel a készítmény egyes esetekben 1-3 órán belül hatni kezd.

AMENNYIBEN A BEAVATKOZÁST DÉLELŐTT 8:00 ÉS 10:00 ÓRA KÖZÖTT VÉGEZZÜK, AKKOR A VIZSGÁLAT ELŐTTI NAPON:

- Ne fogyasszon szilárd táplálékot, csak folyadékot!!!
- 14:00 órakor - igya meg az ELSŐ tasak CITRAFLEET/PICOPREP®-ből készült oldatot.
- 19:00 órakor - igya meg a MÁSODIK tasak CITRAFLEET/PICOPREP®-ből készült oldatot.

A VIZSGÁLAT NAPJÁN:

Ne fogyasszon szilárd táplálékot, csak folyadékot!!!

AMENNYIBEN A BEAVATKOZÁST DÉLELŐTT 10:00 ÉS 12:00 ÓRA KÖZÖTT VÉGEZZÜK, AKKOR A VIZSGÁLAT ELŐTTI NAPON:

Ne fogyasszon szilárd táplálékot, csak folyadékot!!!

14:00 órakor - igya meg az ELSŐ tasak CITRAFLEET/PICOPREP®-ből készült oldatot.

20:00 órakor - igya meg a MÁSODIK tasak CITRAFLEET/PICOPREP®-ből készült oldatot.

A VIZSGÁLAT NAPJÁN:

Ne fogyasszon szilárd táplálékot, csak folyadékot!!!

AMENNYIBEN A BEAVATKOZÁST DÉLUTÁN VÉGEZZÜK, AKKOR A VIZSGÁLAT ELŐTTI NAPON:

Ne fogyasszon szilárd táplálékot, csak folyadékot!!!

18:00 órakor - igya meg az ELSŐ tasak CITRAFLEET/PICOPREP®-ből készült oldatot.

A VIZSGÁLAT NAPJÁN:

Ne fogyasszon szilárd táplálékot, csak folyadékot!!!

06:00 órakor - igya meg a MÁSODIK tasak CITRAFLEET/PICOPREP®-ből készült oldatot.

BUDAI EGÉSZSÉGGKÖZPONT ZRT.

1126 BUDAPEST, KIRÁLYHÁGÓ UTCA 1-3.

T: +36 1 489 5200 E: INFO@BHC.HU W: WWW.BHC.HU





HOGYAN ALKALMAZZA A CITRAFLEET/PICOPREP-ET?

Az előkészítéshez összesen 2 tasak PICOPREP szükséges.

1. Töltsön egy pohárba **150 ml** (1 pohár) hideg vizet.
2. Az 1. tasak CITRAFLEET/PICOPREP tartalmát (fehér, narancsos illatú, kristályos por) keverje el a vízben.
3. Kevergesse 4-5 percig, mialatt a por a vízben teljesen feloldódik. Az oldat felmelegedhet – fogyasztás előtt várja meg, míg lehűl.
4. Az oldat elfogyasztása után igyon meg **ÓRÁNKÉNT 500 ml** (1-2 bögre) tiszta, átlátszó folyadékot az eredményes vizsgálat érdekében! Ez lehet almalé vagy egyéb szénsavmentes, átlátszó gyümölcslé, víz, tea, erőleves tiszta leve. Minél többet iszik, annál könnyebb lesz elvégezni a vizsgálatot. Ha elfelejtette az óránkénti folyadékadagot meginni, minél előbb pótolja! Összesen 3-4 liter folyadékot kell elfogyasztania az előkészítés alatt! Szőlőcukor szopogatása is megengedett még 4 órával a beavatkozás előtt(ig).

Amennyiben a beavatkozást ALTATÁSBAN végezzük, a beavatkozás előtt 4 órával ne fogyasszon folyadékot (vizet se)!

**NE EGYEN, NE IGYON 4ÓRÁVAL
A VIZSGÁLAT ELŐJEGYZETT IDŐPONTJA ELŐTT!**

BUDAI EGÉSZSÉGKÖZPONT ZRT.

1126 BUDAPEST, KIRÁLYHÁGÓ UTCA 1-3.

T: +36 1 489 5200 E: INFO@BHC.HU W: WWW.BHC.HU

Superbrands

