



ORSZÁGOS
GERINCGYÓGYÁSZATI
KÖZPONT

Műtéti tájékoztató és beleegyező nyilatkozatok

MŰTÉTI ÉRZÉSTELENÍTÉS



KEDVES BETEGÜNK!

Az Ön gyógyulása érdekében műtéti beavatkozásra van szükség. A tervezett beavatkozás a megfelelő műtéti érzéstelenítés (anesztézia) nélkül nem végezhető el. Kérem, engedje meg, hogy ezzel kapcsolatosan néhány dologról tájékoztassuk, és felhívjuk a figyelmét arra, amit Önnek tudnia szükséges!

Ezt követően beleegyezését kérjük, hogy az általunk választott érzéstelenítési eljárást, valamint az ahhoz szükség esetén kapcsolódó intenzív kezelést elvégezhessük.

A tájékoztató áttanulmányozása és kitöltése után kérjük, keresse fel az Aneszteziológiai Ambulanciát, ahol altatóorvosától részletesebb tájékoztatást kap, és esetleges kérdéseit is igyekszünk kielégítően megválaszolni. Célszerű ezt a műtét tervezett időpontja előtt 2-3 héttel megtenni, hogy az esetleges kiegészítő vizsgálatokat, kezeléseket el tudjuk végezni. Az ambulancián vizsgálat és a kórelőzmény (előzetes betegségek, korábbi műtétek, orvosi kezelések, rendszeresen szedett gyógyszerek, allergia) utáni tájékozódás történik. Kérjük, hogy ezért korábbi zárójelentéseit, orvosi dokumentációját hozza magával!

Személyes vizsgálatunk és a vizsgálati leletek ismeretében, tájékozódunk az Ön egészségi állapotáról, bíráljuk el a műtéti kockázatot és döntünk az érzéstelenítés (anesztézia) formájáról, kérünk esetleges további vizsgálatokat. Bizonyos esetekben szükséges lehet gyógyszeres előkészítés, vagy az Ön eddigi gyógyszeres kezelésének módosítása.

MILYEN LEHETŐSÉGEK VANNAK A MŰTÉTI ÉRZÉSTELENÍTÉSRE?

Alapvetően három lehetőség van a műtéti érzéstelenítésre:

1. Felügyelet melletti nyugtatás
2. Vezetékes, vagy regionális érzéstelenítés
3. Általános érzéstelenítés (narkózis)

A felügyelet melletti nyugtatás és a regionális érzéstelenítés hatására a beteg lelkiileg ellazult, fájdalommentes állapotba kerül. Általános érzéstelenítés során viszont mélyen alszik.

1. MIT JELENT ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK A FELÜGYELET MELLETTI NYUGTATÁS?

Elsősorban kisebb és rövidebb operációk során alkalmazzuk.

Intravénás nyugtatókat és fájdalomcsillapítókat adunk. A műtéti területet általában helyi érzéstelenítővel tesszük érzéketlenné.

2. MIT JELENT ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK AZ EGY TESTRÉSZRE VONATKOZÓ ÉRZÉSTELENÍTÉS (VEZETÉSES, VAGY REGIONÁLIS ANESZTÉZIA)?

A regionális anesztézia kiiktatja az adott testrész fájdalomérzését, éber állapot mellett. Természetesen a beteg kaphat kiegészítő altatószert is (bódítás).

Az érzéstelenítőszer befecskendezzük a gerincvelői folyadékba – ezt nevezzük spinális érzéstelenítésnek (1. kép). Az érzéstelenítés megkezdése előtt fertőtlenítő folyadékkal lemossuk a bőrt a gerinc ágyéki szakaszán, majd a tűszúrás leendő helye körüli bőrfelületet érzéstelenítjük. Ez után kerül sor az injekciós tű gerincvelői folyadékba történő bevezetésére. A gerincoszlop azon részén, ahol gerincvelő már nem található, csak gerincvelői folyadék. Spinális érzéstelenítés esetén a test deréktól lefelé érzéketlenné válik.




1. kép: Spinális érzéstelenítés

Ha az érzéstelenítőszer a gerincvelői agyhártya körüli részbe fecskendezzük epidurális érzéstelenítésről beszélünk. A hatóanyagot egyszeri injekció formájában vagy katéteren át juttatjuk a kívánt területre. A katéteres adagolás lehetővé teszi az ismételt dózisok adását. Adható az injekció a kar, a láb vagy a nyak valamely idegszálnak környékére is (idegblokád). A fájdalomérzés kikapcsolása fenntartható a műtét utáni időszakban is. Ehhez, az érzéstelenítés kivitelezésekor egy vékony csövet (kanült) vezetünk be, melyen keresztül helyi érzéstelenítő vagy fájdalomcsillapító adagolható, ismételve vagy folyamatosan. Egyes műtéti típusoknál előnyös a narkózis és a regionális anesztézia kombinációja.

3. MIT JELENT ÉS HOGYAN TÖRTÉNIK AZ ÁLTALÁNOS ÉRZÉSTELENÍTÉS (NARKÓZIS)?

A mesterséges altatás – narkózis (3. kép) – során a tudat és a fájdalomérzés kiiktatása történik. A beteg egy alvásszerű állapotban van. Az elaltatás legtöbbször vénás injekció segítségével történik. Hosszabb beavatkozásoknál vagy az intravénás altatószert adjuk folyamatosan, vagy gőz formájú (párolgó) altatószert és altató gázt is adagolunk. Minden esetben támogatjuk a spontán légzést, vagy mesterséges lélegeztetést alkalmazunk, gondoskodunk a megfelelő oxigénellátásról (2. kép).



2. kép: Az oxigénellátás módjai

- a száj és orr fölé helyezett **maszkon** keresztül (*lélegeztető arcmaszk*)
- **légcsőtübuson** keresztül, amelyet a légcsőbe helyezünk (*intratracheális intubáció*)
- **garatmaszkon** keresztül, amelyet a gégefedő fölé helyezünk (*laringeális maszk*)

A lélegeztető arcmaszkot még éber állapotban feltesszük, de a légcsőtübust vagy a garatmaszkot kizárólag elalvás után alkalmazzuk!

Az intubáció megkönnyíti a lélegeztetést és megakadályozza a nyál, vagy gyomortartalom belélegzését (*aspirációt*).

Szükség lehet továbbá izomlazító (relaxáns) adására, amely megkönnyíti az intubációt és a lélegeztetést, javítja a műtéti feltárás körülményeit és csökkenti az altatószerigényt.



3. kép: Általános érzéstelenítés (narkózis)

MILYEN LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK ÉS SZÖVŐDMÉNYEK LÉPHETNEK FEL AZ ANESZTÉZIA SORÁN?

Az altatóorvos (aneszteziológus) folyamatosan ellenőrzi az életfunkciókat a beavatkozás és altatás során esetlegesen fellépő szövődmények megelőzése érdekében (monitorozás).

1. Rendkívül ritka esetben előforduló mellékhatások és szövődmények, amelyek az életet fenyegetik:

- Szív- és keringési elégtelenség (meglévő súlyos szívbetegség esetén)
- Műtét utáni légzési elégtelenség
- Elmozduló vérrög (trombus) miatti érelzáródás (embólia)
- Súlyos túlérzékenységi, allergiás reakció

Még az idős vagy rossz általános állapotú, illetve kísérőbetegségekkel rendelkező betegek esetében is körülbelül 10.000 beavatkozásra csak 1 súlyos aneszteziológiai szövődmény jut. Ily módon e súlyos szövődmények rizikója igen alacsony.

Nemkívánatos hatásokat altatószerek és más gyógyszerek (pl. infúziós oldatok) is kiválthatnak, túlérzékenység vagy a korábban is kezelt betegségek miatt.

2. Nagyon ritka esetben előforduló mellékhatások és szövődmények:

- Vérömleny (a vénaszúrás helyén)
- Vérzés
- Fertőzés
- Idegsérülés

3. Ritka esetben előforduló mellékhatások és szövődmények:

A 60 év feletti betegek 25%-ánál műtét után magasabb rendű gondolkodási funkciók elégtelensége (Kognitív Diszfunkció) alakul ki. A kialakult állapotban a beteg tér és idő érzékelése, észlelése zavart szenved, gyakran közeli hozzátartozóit nem ismeri fel, mindezek súlyos esetben átmeneti vagy tartós önellátási képtelenséghez vezetnek. Ezek a tünetek a műtét utáni harmadik hónapban az idős betegek 10%-ban még fennállnak. Ennek jelenleg sem a kiváltó okát sem a kezelését nem ismerjük.

MILYEN SPECIÁLIS SZÖVŐDMÉNYEI LEHETNEK A NARKÓZISNAK?

1. Nagyon ritkán előforduló speciális szövődmények:

- Testhőmérséklet extrém mértékű emelkedése, ami örökletes izomműködési zavar következménye (malignus hipertermia)
- Maradandó hangképzési zavar (rekedtség)
- Légszomjjal járó hangszalag károsodás

2. Ritkán előforduló speciális szövődmények:

- Hányás – ami az életet veszélyeztető szövődményhez, a hányadék belégzéséhez (aspiráció) vezethet
- Légutak görcsszerű elzáródása – ez rendszerint uralható

3. Előfordulhat:

- Átmeneti nyelési nehézség, rekedtség
- Fogak sérülése vagy elvesztése, különösen mozgó, sérült fogak esetén
- Karok vagy lábak bénulása – a műtéti fektetés, a beavatkozás során történő húzás, vagy feszítés miatt nem zárható ki teljesen - ez általában néhány hónapon belül megszűnik

Amennyiben bármilyen szövődmény, nemkívánatos jelenség lépne fel, természetesen gondoskodunk az Ön további ellátásáról, a szükséges kezelésről.

Bizonyos esetekben szükségessé válhatnak kiegészítő beavatkozások, amelyek nem tartoznak szorosan az érzéstelenítéshez, de elvégzésük az altatóorvos feladata. A műtét sikere és a beteg biztonsága érdekében szükségesek, ilyenek például a vérátömlesztés, a centrális vénás kanül bevezetése, vagy a mesterséges vérnyomáscsökkentés.

MIT TEHET ÖN A MŰTÉTI ÉRZÉSTELENÍTÉS BIZTONSÁGOS LEBONYOLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN?

(Hacsak orvosa nem rendelkezett másképpen).

A beavatkozást megelőzően:

- Az altató orvossal előzetesen egyeztessen a szokásos gyógyszerek bevitelét illetően! Amennyiben a műtét napján szükséges a saját gyógyszerek bevétele kérjük, azt csak egy korty víz segítségével tegye!
- **A műtétet megelőzően 6 órával ne étkezzon!**
- **Legkésőbb a műtét előtt 3 órával fogyaszthat teát, kávét, vizet, szénsavmentes ásványvizet, viszont tejet, tejterméket nem!**
- **3 órával műtét előtt egyáltalán ne igyon!**
- **A műtét napján ne dohányozzon!**

Kérjük, ha ebben az időszakban mégis fogyasztott ételt vagy nagyobb mennyiségű folyadékot, ezt jelezze altatóorvosának!

- Ha kivehető fogpótlást, vagy kontaktlencsét használ, kérjük, távolítsa el!
- Ékszereket, órát a műtőbe ne hozzon magával!
- Körömlakkot, arckrémeket, sminket, testápolót ne használjon, vagy befejezése előtt távolítsa el!
- Kérjük a férfi pácienseinket, borotválkozzanak meg a műtét előtt!
- Ha van hallókészüléke, azt hozza magával.
- A műtőbe szállítás előtt rendszeresen használt szemcseppjét kérjük, cseppentse be!



BUDAI EGÉSZSÉGGKÖZPONT

Élet. Minőség.

A **BUDAI EGÉSZSÉGGKÖZPONT** BUDAPEST MEGHATÁROZÓ MAGÁNEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE, MELY TELJES KÖRŰ, SZEMÉLYRE SZABOTT SZOLGÁLTATÁSAIT MEGBÍZHATÓ, HITELES PARTNERKÉNT NYÚJTJA ÜGYFELEI SZÁMÁRA.



SZOLGÁLTATÁSAINK:

SZAKRENDELÉSEK TÖBB MINT 45 SZAKTERÜLETEN
DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK A LEGMODERNEBB ESZKÖZÖKKEL
PRIVÁT KÓRHÁZI SZOLGÁLTATÁSOK

TELJES KÖRŰ MOZGÁSSZERVI ELLÁTÁS
GYERMEKGYÓGYÁSZATI PROGRAM
PSZICHOLÓGIA, PSZICHIÁTRIA, PSZICHOTERÁPIA

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
PARTNERKAPCSOLATI PROGRAM VÁLLALATOKNAK
MENEDZSERSZŰRÉSEK, TEMATIKUS SZŰRŐVIZSGÁLATOK

EGÉSZSÉGGKÖZPONTOK:

1126 BUDAPEST, NAGY JENŐ U. 8.
1126 BUDAPEST, KIRÁLYHÁGÓ U. 1-3.
1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 135-139.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: +36 1 489 5200

BUDAI EGÉSZSÉGGKÖZPONT KFT
1126 BUDAPEST, KIRÁLYHÁGÓ U. 1-3.
TELEFON: +36 1 489 5200
E-MAIL: INFO@BHC.HU
WEB: BHC.HU

ORSZÁGOS GERINCGYÓGYÁSZATI KÖZPONT
A BUDAI EGÉSZSÉGGKÖZPONT SZAKKÓRHÁZA
1126 BUDAPEST, KIRÁLYHÁGÓ U. 1-3.
E-MAIL: INFO@OGK.HU
WEB: OGK.HU
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: +36 1 887 7900



ORSZÁGOS GERINCGYÓGYÁSZATI KÖZPONT

AZ ORSZÁGOS GERINCGYÓGYÁSZATI KÖZPONT HAZÁNK
EGYETLEN OLYAN KÓRHÁZA, AMELY A GERINCBETEGSÉGEK
DIAGNOSZTIKÁJÁNAK ÉS KEZELÉSÉNEK TELJES SPEKTRUMÁT ÁTFOGJA.



FEKVŐBETEG ELLÁTÁS

MŰTÉTI ÉS KONZERVATÍV TERÁPIÁS (NEM MŰTÉTI) KEZELÉSEK

JÁRÓBETEG ELLÁTÁS

ORTOPÉDIA, REUMATOLÓGIA, NEUROLÓGIA, ELEKTROFIZIOLÓGIA, ANESZTEZIOLÓGIA,
PSZICHOLÓGIA, PSZICHIÁTRIA, GYÓGYTORNÁ

RADIOLÓGIA

DIREKT DIGITÁLIS RÖNTGENBERENDEZÉS, ULTRAHANG, MR, CT ÉS DEXA KÉSZÜLÉKEK

BETEGTÁJÉKOZTATÁS

KUTATÁS-FEJLESZTÉS

EGÉSZSÉGGÖZPONTOK:
1126 BUDAPEST, NAGY JENŐ U. 8.
1126 BUDAPEST, KIRÁLYHÁGÓ U. 1-3.
1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 135-139.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: +36 1 489 5200

BUDAI EGÉSZSÉGGÖZPONT KFT.
1126 BUDAPEST, KIRÁLYHÁGÓ U. 1-3.
TELEFON: (+36) 1 489-5200
FAX: (+36) 1 489-5210
E-MAIL: INFO@BHC.HU
WEB: BHC.HU

ORSZÁGOS GERINCGYÓGYÁSZATI KÖZPONT,
A BUDAI EGÉSZSÉGGÖZPONT SZAKKÓRHÁZA
1126 BUDAPEST, KIRÁLYHÁGÓ U. 1-3.
E-MAIL: INFO@OGK.HU
WEB: OGK.HU
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: (+36) 1 887-7900

KÉRJÜK, KEDVES BETEGÜNK, VÁLASZOLJON AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE!

Név:

Születési idő:

Testmagasság:

Testsúly:

1. Áll-e, vagy állt-e a közelmúltban orvosi kezelés alatt? igen nem

Ha igen, mi miatt?.....

**2. Szed-e rendszeresen, vagy szedett-e a közelmúltban gyógyszereket?
Sorolja fel azokat, pontos adagolásukat és a bevitel gyakoriságát!** igen nem

.....

.....

.....

3. Végeztek-e Önön korábban műtétet? igen nem

Mikor, milyen műtétet?

4. Fellépett-e Önnél vagy vérrokonainál a műtéti érzéstelenítéssel kapcsolatos szövődmény? igen nem

5. Kapott-e valaha vérátömlesztést? igen nem

Fellépett-e ezzel kapcsolatos szövődmény? igen nem

6. Lehetséges-e, hogy Ön terhes? igen nem

7. Tudomása szerint szenved -e vagy szenvedett-e az alábbi betegségek valamelyikében?

• **Szív/Keringés:** ritmuszavar, koszorúér betegség, szívinfarktus, magas vérnyomás, billentyűhiba, igen nem
Egyéb:

• **Érrendszer:** visszereesség, trombózis, embólia, érszűkület, igen nem
Egyéb:

• **Légzőrendszer:** krónikus bronchitis, asthma, tüdőgyulladás, TBC, tüdőtágulat igen nem
Egyéb:

• **Máj:** sárgaság, májgyulladás, májzsugor, epekő, igen nem
Egyéb:

• **Vese:** vesegyulladás, vesekő, húgyúti fertőzés, igen nem
Egyéb:

• **Emésztőrendszer:** fekély, savtúltermelés, véres vagy fekete széklet, hasnyálmirigy gyulladás, igen nem
Egyéb:

• **Anyagcsere:** cukorbetegség, magas koleszterin vagy vérszír szint, köszvény, igen nem

Egyéb:

• **Pajzsmirigy: alul- vagy túlműködés, golyva,** igen nem

Egyéb:

• **Idegrendszer:** epilepszia, agyvérzés, agyérgörcs, bénulás, depresszió, pánik-betegség igen nem

Egyéb:

• **Érzékszervek:** zöld hályog, nagyothallás igen nem

Egyéb:

• **Véralvadás:** vérzékenység, gyakori orrvérzés, trombózis hajlam igen nem

Egyéb:

• **Allergia, túlérzékenység:** gyógyszer, élelmiszer, jód, ragtapasz igen nem

• **Csont- és izomrendszer:** ízületi betegség, gerincbetegség, izomsorvadás, igen nem

Egyéb:

○ Vérrokonai közül valaki szenved -e izombetegségben? igen nem

8. Eddigiekben nem említett egyéb betegség: igen nem

.....

9. Fogazat: mozgó fog, kivehető pótlás igen nem

.....

10. Dohányzás: igen nem

11. Alkoholfogyasztás: kérjük, húzza alá az Önre vonatkozókat!

egyáltalán nem	ritkán	rendszeresen	kis mennyiséget
nagyobb mennyiséget	sört	bort	égetett szeszesitalt

12. Használ-e rendszeresen altatót, nyugtatót? igen nem

Ha igen, mit?.....

13. Használ vagy használt-e valaha kábítószeret? igen nem

Ha igen, mit?

14. Van-e tudomása olyan betegségről vagy körülményről, mely az ellátó személyzet biztonságát, vagy egészségét veszélyeztetheti? igen nem

Ha igen, mi az?

15. Használja-e a következő segédeszközök valamelyikét? igen nem

Szemüveg kontaktlencse hallókészülék művégtag

Egyéb:.....

**BELEEGYZŐ NYILATKOZAT
A MŰTÉTI ÉRZÉSTELENÍTÉS ELVÉGZÉSÉHEZ,
VALAMINT AZ AHHOZ SZÜKSÉG ESETÉN KAPCSOLÓDÓ INTENZÍV KEZELÉSHEZ**

- A tájékoztató elolvasása és Dr. altatóorvossal történt beszélgetésem után a műtétemhez szükséges aneszteziológiai beavatkozásba, valamint az ahhoz szükség esetén kapcsolódó intenzív kezelésbe beleegyezem.
- Az érzéstelenítés módjáról, a lehetséges szövődményekről, nemkívánatos hatásokról szóban és írásban tájékoztatást kaptam, azt megértettem.
- Tudomásul veszem, hogy a műtétet követő 24 órában önálló közlekedésre alkalmatlan vagyok, ez idő alatt alkoholt nem fogyaszthatok, altató, nyugtató és fájdalomcsillapító szert csak orvosi utasításra kaphatok.
- Az előre nem látható körülményekből adódó változtatásokat elfogadom.
- Az altatóorvos által javasolt előkészítésbe illetve kiegészítő vizsgálatokba beleegyezem.
- Kérdéseimet feltehettem, a zokra kielégítő választ kaptam.
- Az altatással és az intenzív kezeléssel kapcsolatban több kérdésem nincs.
- Szükség esetén a műtét időpontjának halasztását elfogadom.

A páciens észrevételei:

.....

.....

.....

Budapest,

.....
aneszteziológus

.....
Páciens, vagy törvényes képviselő

Tanú 1 (név, lakcím):

.....

Tanú 2 (név, lakcím):

.....

**BELEEGYZŐ NYILATKOZAT
A MŰTÉTI ÉRZÉSTELENÍTÉS ELVÉGZÉSÉHEZ,
VALAMINT AZ AHHOZ SZÜKSÉG ESETÉN KAPCSOLÓDÓ INTENZÍV KEZELÉSHEZ**

- A tájékoztató elolvasása és Dr. altatóorvossal történt beszélgetésem után a műtétemhez szükséges aneszteziológiai beavatkozásba, valamint az ahhoz szükség esetén kapcsolódó intenzív kezelésbe beleegyezem.
- Az érzéstelenítés módjáról, a lehetséges szövődményekről, nemkívánatos hatásokról szóban és írásban tájékoztatást kaptam, azt megértettem.
- Tudomásul veszem, hogy a műtétet követő 24 órában önálló közlekedésre alkalmatlan vagyok, ez idő alatt alkoholt nem fogyaszthatok, altató, nyugtató és fájdalomcsillapító szert csak orvosi utasításra kaphatok.
- Az előre nem látható körülményekből adódó változtatásokat elfogadom.
- Az altatóorvos által javasolt előkészítésbe illetve kiegészítő vizsgálatokba beleegyezem.
- Kérdéseimet feltehettem, azokra kielégítő választ kaptam.
- Az altatással és az intenzív kezeléssel kapcsolatban több kérdésem nincs.
- Szükség esetén a műtét időpontjának halasztását elfogadom.

A páciens észrevételei:

.....

.....

.....

Budapest,

.....
aneszteziológus

.....
Páciens, vagy törvényes képviselő

Tanú 1 (név, lakcím):

.....

Tanú 2 (név, lakcím):

.....

ORSZÁGOS GERINCGYÓGYÁSZATI KÖZPONT

CÍM: 1126 BUDAPEST, KIRÁLYHÁGÓ UTCA 1-3.
TELEFON: +36 1 887 7900
FAX: +36 1 887 7987
E-MAIL: INFO@OGK.HU
WEB: WWW.OGK.HU