



BUDAI EGÉSZSÉGGÖZPONT

PICOPREP BETEGTÁJEKOZTATÓ VASTAGBÉL-TÜKRÖZÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ

Mivel Ön kolonoszkópia előtt áll, vizsgálata előtt diétát kell tartania és béltisztító készítményt kell alkalmaznia a belek kitisztítása érdekében. A jó béltisztítás a pontos diagnózis alapvető feltétele. Kezelőorvosa a PICOPREP nevű készítményt ajánlotta Önnek, amelyet a Budai Egészségközpont vizsgálati rendje szerint a következőképpen kell alkalmaznia.

Miután megitta a PICOPREP-et, tartózkodjon mosdó közelében, mivel a készítmény egyes esetekben 1-3 órán belül hatni kezd.



AMENNYIBEN A BEAVATKOZÁST DÉLELŐTT 8:00 ÉS 10:00 ÓRA KÖZÖTT VÉGEZZÜK, AKKOR A VIZSGÁLAT ELŐTTI NAPON:



Ne fogyasszon szilárd táplálékot, csak folyadékot!!!

14:00 órákor - igya meg az ELSŐ tasak PICOPREP®-ből készült oldatot.

19:00 órákor - igya meg a MÁSODIK tasak PICOPREP®-ből készült oldatot.

A VIZSGÁLAT NAPJÁN:

Ne fogyasszon szilárd táplálékot, csak folyadékot!!!

AMENNYIBEN A BEAVATKOZÁST DÉLELŐTT 10:00 ÉS 12:00 ÓRA KÖZÖTT VÉGEZZÜK, AKKOR A VIZSGÁLAT ELŐTTI NAPON:

Ne fogyasszon szilárd táplálékot, csak folyadékot!!!

14:00 órákor - igya meg az ELSŐ tasak PICOPREP®-ből készült oldatot.

20:00 órákor - igya meg a MÁSODIK tasak PICOPREP®-ből készült oldatot.



A VIZSGÁLAT NAPJÁN:

Ne fogyasszon szilárd táplálékot, csak folyadékot!!!

BUDAI EGÉSZSÉGGÖZPONT KFT
1126 BUDAPEST, NAGY JENŐ U. 8.

T: +36 1 489 5200 E: INFO@BHC.HU W: WWW.BHC.HU



AMENNYIBEN A BEAVATKOZÁST DÉLUTÁN VÉGEZZÜK, AKKOR A VIZSGÁLAT ELŐTTI NAPON:

Ne fogyasszon szilárd táplálékot, csak folyadékot!!!

18:00 órákor - igya meg az ELSŐ tasak PICOPREP®-ből készült oldatot.



A VIZSGÁLAT NAPJÁN:

Ne fogyasszon szilárd táplálékot, csak folyadékot!!!

06:00 órákor - igya meg a MÁSODIK tasak PICOPREP®-ből készült oldatot.

HOGYAN ALKALMAZZA A PICOPREP-ET?

Az előkészítéshez összesen 2 tasak PICOPREP szükséges.

1. Töltsön egy pohárba **150 ml** (1 pohár) hideg vizet.
2. Az 1. tasak PICOPREP tartalmát (fehér, narancsos illatú, kristályos por) keverje el a vízben.
3. Kevergesse 4-5 percig, mialatt a por a vízben teljesen feloldódik. Az oldat felmelegedhet – fogyasztás előtt várja meg, míg lehűl.
4. Az oldat elfogyasztása után igyon meg **ÓRÁNKÉNT 500 ml (1-2 bögre)** tiszta, átlátszó folyadékot az eredményes vizsgálat érdekében! Ez lehet almalé vagy egyéb szénsavmentes, átlátszó gyümölcslé, víz, tea, erőleves tiszta leve. Minél többet iszik, annál könnyebb lesz elvégezni a vizsgálatot. Ha elfelejtette az óránkénti folyadékadagot meginni, minél előbb pótolja! Összesen 3-4 liter folyadékot kell elfogyasztania az előkészítés alatt!

Amennyiben a beavatkozást *ALTATÁSBAN* végezzük, a beavatkozás előtt 4 órával ne fogyasszon folyadékot (vizet se)!

NE EGYEN, NE IGYON 4 ÓRÁVAL A VIZSGÁLAT ELŐJEGYZETT IDŐPONTJA ELŐTT!